

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Antracol 70WP** με αριθμό εγγραφής **24**.

07 Σεπτεμβρίου 2011

Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience AG

Εμπορικό Όνομα: Antracol 70WP

Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: propineb 70% β/β
βοηθητικές ουσίες 23,08% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: propineb 800g/kg min

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, Γερμανία

Παρασκευαστής σκευάσματος Bayer CropScience AG, Γερμανία

Διανομέας: Κώστας Χριστοδούλου Λτδ

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Το ANTRACOL 70 WP είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτονο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Δρα σε περισσότερες από μια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Φάσμα δράσης

| Καλλιέργειες | Στόχος | Δόση (γρ. σκευάσμ./ δεκ.) | Δόση (γρ. σκευάσμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Μηλιά | Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) (<i>Venturia pyrina</i>) | 120-225 | 150 | 80-150 | Προληπτικά 2 ψεκασμοί: ένας πριν από την άνθηση και ένας μετά από την άνθηση | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-21 ημέρες |
| Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) | Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) | 120-200 | 200 | 60-100 | Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση.* | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες |
| Τομάτα (Υπαίθρου + θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium spp.</i>) | 120-250 (Υ) | 200-250 | 60-100 | Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| | | 120-300 (Θ) | | 60-120 | | |
| Αγγούρι (Θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200-250 | 200-250 | 100-120*** | Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Πατάτα | Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) | 200-250 | - | 50-100 | Προληπτικοί Ψεκασμοί φυλλώματος | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| Πεπόνι Καρπούζι | Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200-250 | 200-250 | 100 | Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες |
| Καπνός | Περονόσπορος (<i>Peronospora tabacina</i>) | 200 | 200 | 100 (σπορείο) | Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος στα σπορεία | Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. |
| | | | | 80-240 (μετά τη μεταφύτευση) | Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος μετά τη μεταφύτευση | +2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. |
| Καλλωπιστικά | Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) Σκωρίαση (<i>Uromyces spp.</i>) | 200 | 200 | 100 | Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος | - |

Παρατηρήσεις

* Στο αμπέλι το διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση να είναι 30 ημέρες

**Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.

*** Στο αγγούρι ο μέγιστος όγκος νερού στο στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση 200γρ/100 λιτ. νερό, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση 250 γρ/δεκ.

- Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ σε χαμηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσματος στο δεκάριο.

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

- Η εφαρμογή του σκευάσματος ANTARCOL 70 WP δεν θα πρέπει να γίνεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).

Χρόνος Ασφάλειας:

| Καλλιέργεια | Ημέρες |
|--------------|-----------|
| Μηλιά | — |
| Αμπέλι | 60 ημέρες |
| Τομάτα (Υ) | 14 ημέρες |
| Πατάτα | 28 ημέρες |
| Τομάτα (Θ) | 3 ημέρες |
| Αγγούρι(Θ) | 7 ημέρες |
| Πεπόνι | 7 ημέρες |
| Καρπούζι | 7 ημέρες |
| Καπνός | — |
| Καλλωπιστικά | — |

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M3.....

Φυτοτοξικότητα: Να μην εφαρμόζεται κατά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας.....

Σήμανση τοξικότητας: Χη- Επιβλαβές N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.....

R48/20/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.....

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.....

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.....

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S24 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα

"Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα, μάσκα και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση ή ψεκασμό".

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»

«Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ πριν και μετά την εφαρμογή»

«Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»

S 60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για τις δένδρωδεις καλλιέργειες και **10 μέτρων** για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, από τα επιφανειακά ύδατα

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Απομακρύνετε τον ασθενή από την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του μετακινήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία (σακούλα).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία: Πλύση στομάχου και στη συνέχεια χορήγηση άνθρακα και θειικού νατρίου. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το proprineb έχει δράση δισουλφιράνης.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.