

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Alfil 80WP με αριθμό εγγραφής 2596 .

18 Φεβρουαρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: ΦΑΡΜΑ – ΧΗΜ ΑΒΕΕ – ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό Όνομα: Alfil 80WP

Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl-Al 80% β/β

βοηθητικές ουσίες 16.67% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: fosetyl-Al 96% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Industrias Afrasa S.A.

Παρασκευαστής σκευάσματος: ΦΑΡΜΑ – ΧΗΜ ΑΒΕΕ – ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας: Λ. Λάμπρου Άγκρο Λτδ

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος, εμφάπτιση ριζώματος, ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή	φυτόφθορα	250-300	Ένας ψεκασμός το μήνα, αρχίζοντας την περίοδο της ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα ψεκασμό στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Συνολικά κάνουμε 3-4 ψεκασμούς το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη). Για τη φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει το χρώμα (1-2 ψεκασμοί).
Μηλιές	φυτόφθορα λαιμού και ριζών	250	3-4 ψεκασμοί στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού).
Αμπέλι	περονόσπορος	250-300	Ψεκασμοί στα παρακάτω στάδια: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
Φράουλα	σήψεις λαιμού	200-250	Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση ή
		400	ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση.
Κρεμμύδια Πράσα	περονόσπορος	300 γρ/δεκ.	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.
Τομάτα υπαίθρου	περονόσπορος	200-300	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.
Τομάτα θερμοκηπίου	περονόσπορος	300-400	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας ψεκασμοί ανά 8-10 ημέρες.
Αγγούρι Κολοκυθάκι Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι	περονόσπορος	200-300	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δύο ψεκασμοί το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο ψεκασμός ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση.
Κουνουπίδι Κραμπί Μαρούλι	περονόσπορος	60 γρ/τετρ. μέτρο	Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά την σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.
Πατάτα	περονόσπορος	250-300	Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα.
Λυκίσκος	περονόσπορος	250-300	Ψεκασμοί: 1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ., και 2ος όταν φθάσει 20-30 εκ.
Καπνός	περονόσπορος	250-300	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής.
Κωνοφόρα	Προσβολή από <i>Phytophthora cactorum</i>	250	Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη διάρκεια της ανάπτυξης (συνολικά 3 ψεκασμοί).

Καλλωπιστικά (Φυτώρια- Σπορεία)	Φυτόφθορα	400 γρ./ κυβ.μέτρο χώματος.	Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος.
		10 γρ. / τετρ.μέτρο	Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

- Εσπεριδοειδή, Μηλιές, Αμπέλι, Κρεμμύδια, Τομάτα,
Κολοκυνθοειδή, Πράσα, Πατάτα, Καλλωπιστικά:

4 εφαρμογές

- Φράουλα, Κουνουπίδι, Κραμπί, Μαρούλι, Λυκίσκος,
Κωνοφόρα:

2 εφαρμογές**Χρόνος ασφάλειας****Αμπέλι, Μαρούλι, Κραμπί, Φράουλα:****14 ημέρες****Λοιπές καλλιέργειες:****3 ημέρες**

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις
..... και δόσεις εφαρμογής.....

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό, με
ελαιώδη σκευάσματα, με σκευάσματα που περιέχουν dicofoI, με σκευάσματα θείου
υγρής μορφής καθώς και με διαφυλλικά σκευάσματα με βάση το άζωτο.....

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 33.....

Σήμανση τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό.....

Φράσεις κινδύνου:

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.....

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S23 Μην αναπνέετε τη σκόνη και το ψεκαστικό υγρό
- S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως επί τουλάχιστον 15 λεπτά με τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε στον ασθενή 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μια κουταλιά σιρόπι IPECAC για να προκληθεί εμετός. Αν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά, επαναλάβετε ακόμη μια φορά τη χορήγηση σιροπιού. Διαφορετικά προκαλέστε τον εμετό με το δάκτυλό σας. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από στόματος αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.