

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Pendigan 33EC με αριθμό εγγραφής 2760 .

22 Μαΐου 2009

Κάτοχος εγγραφής: ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ

Εμπορικό Όνομα: Pendigan 33EC

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: pendimethalin 33% β/ο  
βοηθητικές ουσίες 64.4% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: pendimethalin 95% β/β min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ

Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας: Rallis India Ltd., Ινδία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Feinchemie Schwebda GMBH, Germany

Διανομέας: Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

### Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτεμα τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλοζιακό καπνού. Επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Δρα δια επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλαίων οφθαλμών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή αν δεν βρέξει μέσα σε 5-6 ημέρες χρειάζεται πότισμα. Επίσης, εφαρμόζεται ως αντιφυλλιαζιακό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογημένα καπνόφυτα.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3 -4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

### Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (κ.εκ./δεκάριο)	Χρόνος – Τρόπος Εφαρμογής (παρατηρήσεις)
<b>Εσπεριδοειδή:</b> -Πορτοκαλιά -Λεμονιά -Μανταρινιά -Γκρεϊπ-φρουτ, -Φράπα -Κίτρο	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.
<b>Μηλοειδή:</b> -Μηλιά -Αχλαδιά	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
<b>Πυρηνόκαρπα:</b> -Ροδακινιά -Νεκταρινιά -Βερικοκιά -Δαμασκηλιά -Κερασιά	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).
<b>Αμπέλι</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά τον λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης).
<b>Φράουλα</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-550	α) πριν την εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας με ενσωμάτωση ή β) κατά τον λήθαργο σε εγκατεστημένη φυτεία.
<b>Καρότο</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά).
<b>Κρεμμύδι</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου).
<b>Σκόρδο</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου).

<b>Τομάτα Πιπεριά</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Πριν τη μεταφύτευση.
<b>Κραμπί Μπρόκολο Κουνουπίδι</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Πριν τη μεταφύτευση.
<b>Ψυχανθή:</b> Μπιζέλι Φασόλι	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).
<b>Όσπρια:</b> Μπιζέλι Φασόλι Ρεβίθι Κουκιά	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).
<b>Μαρούλι Ραδίκι</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Πριν τη μεταφύτευση.
<b>Σπαράγγι</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	500-600	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου.
<b>Αγκινάρα</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-500	Πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων.
<b>Ηλιάνθος Σόγια Αραχίδα</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).
<b>Πατάτα</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση).
<b>Καπνός</b> α) ως ζιζανιοκτόνο	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών.
β) σαν αντιφυλλιζιακό των Αμερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ & Βιρτζίνια	Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλαίων οφθαλμών-φυλλιζίων	400	Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ.εκ. ψ.υ./φυτό, διαλύματος 10 κ.εκ. προϊόντος /L.
<b>Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).
<b>Αραβόσιτος</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400-600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).
<b>Καλλωπιστικά:</b> (συμπεριλαμβανόμενα τα φυτώρια)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	300-400	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

**Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών: 1 εφαρμογή / καλλιεργητική περίοδο**

**\*Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:**

**Ευαίσθητα ζιζάνια:** Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πράσινη Σετάρια (*Setaria viridis*), Σπονδυλωτή Σετάρια (*Setaria verticillata*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Κοινή πτόα (*Poa annua*).

**Μετρίως ευαίσθητα:** Αγριοβρώμη (*Avena sterilis*), Ήρα (*Lolium spp.*).

**Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Πλαγιαστό Βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αναγαλλίς (*Anagallis arvensis*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Κολλητσιίδα (*Galium spp.*), Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*), Μολόχα (*Malva spp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea*), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas*), Ρανούγκουλος (*Ranunculus spp.*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Κουφάγκαθο (*Silybum marianum*), Σισίμπριο (*Sisymbrium spp.*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba*), Στύφνος (*Solanum nigrum*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Τριβόλι (*Tribulus terrestris*), Βερόνικα (*Veronica hederifolia, V. persica*), Αγριομάρουλο (*Lactuca serriola*)

**Μετρίως ευαίσθητα:** Πεντάνευρο (*Plantago spp.*), Λάπαθο (*Rumex crispus*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Αγριομπαμπακιά, (*Abutilon theophrasti*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*).

**Παρατηρήσεις :****Διαχείριση ανθεκτικότητας:..... Ομάδα Τρόπου Δράσης:.....**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία pendimethalin.

**Παρατηρήσεις:**

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Pendigan 33 EC.

- Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- Η δράση του Pendigan 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση - «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

- Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη

σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών.

- Το Pendigan 33 EC καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο.

- Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη *Prunus* sp., Κουμπρεσοκύπαρις (*Cypressocyparis leylandii*), Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταιγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο πουρνάρι (*Ilex* sp.), Πασχαλιά (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia grandiflora*), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοίνικας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λεύκα (*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαίουσα (*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδεντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camelia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνίαστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσσι (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Euonymus japonicus*), Πυράκανθα (*Pyracantha coccinea*), Φορσύθια (*Forsythia intermedia*), Ιβίσκος (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίροπας (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απόλλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hederahelix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιασεμί (*Jasminum* sp.), Μυόπορο (*Myoporum parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λίλιουμ (*Lilium* sp.), Παιώνια (*Paeonia* sp.), Γλυτσίνα (*Wisteria* sp.), *Ammophila* sp.

- Το Pendigan 33 EC είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητά του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα.

- Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το Pendigan 33 EC σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία.

- Μην εφαρμόζετε το Pendigan 33 EC σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του Pendigan 33 EC με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών.

- Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του Pendigan 33 EC πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών.

- Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί Pendigan 33 EC κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το Pendigan 33 EC πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.

- Μην εφαρμόζετε το Pendigan 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής:**

- Καρότο:90 ημέρες
- Λοιπές καλλιέργειες: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

**Συνδυαστικότητα:** Να μην συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη - Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**Φράσεις κινδύνου:**

**R10** Εύφλεκτο

**R36/37/38** Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

**R65** Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

**R67** Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**R50/53** Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

**S25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια

**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας  
ματιών και προσώπου.

«Φοράτε κατάλληλες μπότες.»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες  
εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.»

**S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές  
οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

## Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

## Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## Ανάκληση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή μελέτη εναέριας μεταφοράς της δραστικής ουσίας σε μικρές αποστάσεις, όπως προβλέπεται από την Οδηγία καταχώρισης.

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα I του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.