

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Ortiva Top 20/12,5SC με αριθμό εγγραφής 2825.

09 Ιουλίου 2010

Κάτοχος εγγραφής: Syngenta Hellas AEBE

Εμπορικό Όνομα: Ortiva Top 20/12,5SC

Μορφή: Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: azoxystrobin: 20% β/ο
difenoconazole: 12,5% β /ο
βοηθητικές ουσίες: 68,6% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
azoxystrobin: 930 g/kg min.
difenoconazole: 940 g/kg min

Παρασκευαστής των δραστικών ουσιών: Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας

Εργοστάσιο παρασκευής δραστικών ουσιών:
1. Azoxystrobin - Grangemouth Works, Αγγλία
2. Difenoconazole - Syngenta Crop Protection Monthey SA, Ελβετία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας

Διανομέας: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο προστατευτικό με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων.

Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο αποτελεσματικό σε μεγάλο εύρος παθογόνων μυκήτων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (κ.εκ. σκευάσμ./ δεκ.)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Τομάτα (υπαίθρου και βιομηχανική)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	80-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα (υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	80-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρότο (υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>)	80-100	30-50	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Χρόνος Ασφάλειας:

τομάτα (υπαίθρου και βιομηχανική), μελιτζάνα (υπαίθρου): 7 ημέρες

καρότο (υπαίθρου): 14 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή. (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
- Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12,5SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Η χρήση στη μελιτζάνα (υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον Κανονισμό 396/2005, μέγιστα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων σύμφωνα με την πιο πάνω Ορθή Γεωργική Πρακτική. Ο κάτοχος εγγραφής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: azoxystrobin – 11

difenoconazole – 3

- Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20,12,5SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20,12,5SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs και τους DMIs με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με Ortiva Top, να ξεπλένονται σχολαστικά πριν τη χρήση σε καλλιέργεια μηλιάς.

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης των δραστικών ουσιών στο Παράρτημα I του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.