



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3451, ημερομηνίας 17/02/2012 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο υποβάλλεται επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

..... **PROMANAL AGRO** ..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

2912

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/02/2012

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2019

2. Κάτοχος της άδειας:

W. NEUDORFF GmbH KG, GERMANY

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες και δοχεία	1, 5, 20 και 200 λίτρα	HDPE ή COEX

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

#### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπέκ τύπου σκούπας

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.

Σε περίπτωση που το αναμείξουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόση κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής
<b>Εσπεριδοειδή</b>  Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Κίτρομηλιά	-Κοκκοειδή (κόκκινη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, άσπρη ψώρα, ψευδόκοκκος, παρλατόρια, λεκάνιο) -Αφίδες -Ακάρεια -Προνύμφες εντόμων		Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) -Καλοκαιριού -Φθινοπώρου -Χειμώνα Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και το χειμώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο)
<b>Μηλοειδή</b>  Μηλιά Αχλαδιά	-Κοκκοειδή (βαμβακάδα, μαύρη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, σφαιρολεκάνιο) -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου	
<b>Πυρηνόκαρπα</b>  Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά	-Κοκκοειδή (βαμβακάδα, μαύρη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, σφαιρολεκάνιο) -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων		Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα.
<b>Ελιά</b>	-Κοκκοειδή (παρλατόρια, ασπιδιωτός, λεκάνιο, πολίνια) -Προνύμφες εντόμων		
<b>Καλλωπιστικά</b>	-Κοκκοειδή (παρλατόρια, μυτιλόμορφη ψώρα) -Αυγά τετρανύχων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων		
<b>Παρατηρήσεις:</b> 1. Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 2. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.			

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: - **20 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες**

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

1. Να μη γίνεται εφαρμογή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C.
2. Να μην εφαρμόζεται επί 30 ημέρες πριν ή μετά από εφαρμογές σκευασμάτων που περιέχουν θείο ή θειασβέστιο.
3. Στα μηλοειδή και ιδιαίτερα στην ποικιλία κρυστάλλι, να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan για διάστημα τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας.
4. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα (βορδιγάλειο πολτό, θειασβέστιο, θείο, propargite, captan).  
Να μην χρησιμοποιείται μαζί ή αμέσως πριν ή μετά από ψεκασμό με folpet.

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xn – Επικίνδυνο, Xi – Ερεθιστικό

12. Φράσεις κινδύνου:

**R20/21/22** Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή με το δέρμα και σε περιπτώσεις κατάποσης  
**R36** Ερεθίζει τα μάτια  
**RO4/RO7** Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
**R53** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

### 13. Φράσεις ασφάλειας:

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S23** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.  
**S25** Αποφεύγεται επαφή με τα μάτια.  
**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.  
**S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη.  
**SY1/4** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, λαστιχένια γάντια και γυαλιά ή μάσκα όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.  
**SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.  
**SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή. Εάν δεν αναπνέει κάντε τεχνητή αναπνοή. Αν χρειαστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή  
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής

### Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Ημερομηνία: .....20/02/2012.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα