



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3480, ημερομηνίας 10/07/2012 για χορήγηση προσωρινής άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

χορηγείται προσωρινή άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **...FANTIC M WG...** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2950

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

26/10/2012

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2013

2. Κάτοχος της άδειας:

Isagro S.p.A., Italy
Centro Uffici S. Siro
Edificio D-ala 3
via Caldera 21
20153 Milano, Italy

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

P. G. Mavrikios Agrochemicals Co Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

P. G. Mavrikios Agrochemicals Co Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Fantic M WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
benalaxyl-M: 4 % β/β
mancozeb: 65 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 19,28 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Isagro S.p.A., Ιταλία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: S.T.I Solfotecnica Italiana, Ιταλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: S.T.I Solfotecnica Italiana, Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	200gr και 1Kg	Σακούλα πολυαιθυλενίου / πολυεστέρας και κουτί χάρτινο
2	Σάκοι	10Kg και 25Kg	πολυαιθυλενίου/ πολυεστέρας

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1. Benalaxyl-M
2. Mancozeb

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 1. ---
2.800gr/Kg

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: 1. Benalaxyl-M: Isagro S.p.A., Ιταλία
2. Mancozeb: Indofil Industries Ltd

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: 1. Benalaxyl-M: Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd
2. Mancozeb: Indofil Industries Ltd, India

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου στις καλλιέργειες της πατάτας, ντομάτας, κρεμμυδιών και αμπελιού.

Το Fantic M WG περιέχει 4% Benalaxyl-M και 65% Mancozeb.

Το Benalaxyl-M είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, της ομάδας των φαινυλαμιδίων. Η δράση του είναι προληπτική και κάλυψης στις επιφάνειες του φυτού και θεραπευτική στο εσωτερικό των φυτικών ιστών.

Το Mancozeb είναι μυκητοκτόνο επαφής, που ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών και έχει ευρύ φάσμα δράσης.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφοι ψεκασμοί καλύψεως

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, υπό συνεχή ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	250	100	250	Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται όταν υπάρχουν συνθήκες ευνοϊκές για την εμφάνιση της ασθένειας. Επανάληψη των ψεκασμών με μεσοδιαστήματα 7-10 ημέρες	3
Ντομάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)					
Κρεμμύδια	Περονόσπορος (<i>Phytophthora destructor</i>)					
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopora viticola</i>)				1 ^{ος} ψεκασμός με την έναρξη της ανθοφορίας Επανάληψη κάθε 10 – 12 ημέρες	

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	42 ημέρες
Κρεμμύδια	28 ημέρες
Πατάτα, Ντομάτα	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 1. Benalaxyl-M:4
2. Mancozeb: M3

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xn - Επικίνδυνο, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

12. Φράσεις κινδύνου:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

13. Φράσεις ασφάλειας:

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S29** Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
- S35** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
- S36/37** Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S61** Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **10μέτρων** για τις καλλιέργειες της πατάτας, ντομάτας και κρεμμυδιών και **20μέτρα** για την καλλιέργεια του αμπελιού από τα επιφανειακά νερά.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:26/10/2012.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα